


CORTISOLO PRE-VETORYL[®]: UN PROTOCOLLO INNOVATIVO PER IL MONITORAGGIO



1) PU/PD, polifagia, affanno e letargia dovrebbero sparire o migliorare in un mese. Alopecia e addome a botte possono richiedere 3-6 mesi per sparire.
2) Rivalutare l'anamnesi e considerare il test di stimolazione con ACTH pre-Vetoryl[®].
3) Se i sintomi non sono adeguatamente controllati nell'arco delle 24 ore intercorrenti tra due somministrazioni, si può aumentare la dose totale del 50% e dividerla in due somministrazioni uguali al mattino e alla sera.
4) Utilizzare le possibili combinazioni di capsule di Vetoryl[®] esistenti per aumentare o diminuire la dose giornaliera necessaria.
5) Desametasone per il trattamento dell'ipocortisolemia, soluzione fisiologica EV per trattare la disidratazione e l'iperpotassiemia, in alternativa si può utilizzare idrocortisone CRI e soluzione fisiologica EV.

* Questi valori sono stati ottenuti utilizzando analizzatori Siemens IMMULITE[®] 1000/2000; altri strumenti e metodi di analisi potrebbero dare risultati differenti, in caso di dubbio consultare il proprio laboratorio di fiducia.